




# PARVOVIROSE

## PARVOVÍRUS

Vírus da parvovirose



### 🐾 O QUE É?

É uma doença viral altamente contagiosa que afeta geralmente cachorros entre 6 semanas a 6 meses de idade ou em cães adultos não vacinados;

Por razões desconhecidas, algumas raças de cães, como Rottweiler, Pinscher, PitBull, Labrador Retriever e Pastor Alemão são particularmente vulneráveis à doença.



IMAGEM 1: INTESTINO INFECTADO.




IMAGEM 2: ESTÔMAGO INFECTADO.

### 🐾 SINAIS CLÍNICOS

O vírus manifesta-se de 2 formas diferentes:

**INTESTINAL** vômitos, diarreia grave (muitas vezes com sangue), perda de peso, falta de apetite, prostração, desidratação, etc;

**CARDÍACA** o vírus ataca os músculos do coração de cachorros muito jovens e que morrem subitamente sem mostrar sintomas clínicos.

### 🐾 TRANSMISSÃO

É feita através do contacto directo com um cão infectado, ou indirecto, através de ambientes, pessoas ou objectos contaminados pelas fezes (ex: canis, pratos de comida, camas, coleiras, trelas, mãos, sapatos, etc).





# PARVOVIROSE



## 🐾 FACTORES

O desenvolvimento da doença está ligado aos seguintes factores:

- Carga viral muito elevada, acima da capacidade de defesa do organismo;
- Baixa imunidade;
- Más condições corporais devido a alimentação deficiente, parasitismo, causas genéticas, ou outros.

## ATENÇÃO:

🐾 **ESTE VÍRUS É RESISTENTE À MAIORIA DOS PRODUTOS DE DESINFECÇÃO:**

🐾 **ELE PODE SOBREVIVER NO SOLO POR LONGOS PERÍODOS DE TEMPO:**

🐾 **HIPOCLORITO DE SÓDIO = LEXÍVIA É O MAIS EFICAZ!**



## 🐾 PREVENÇÃO

### VACINAÇÃO:

- A vacinação começa às 6 semanas;

### HIGIENE:

- Manter uma boa higiene do seu animal;
- Desinfecção das instalações;

### CONTROLO:

- Não ter contacto com outros animais ou com a rua;
- Manter os cães novos em quarentena;

